bulletin

#2020-1

PANORAMA

Cahier thématique

Peste porcine africaine : comment faire face à la menace mondiale

PERSPECTIVES | # DOSSIER | # AUTOUR DU MONDE

www.oiebulletin.com

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE
Protéger les animaux, préserver notre avenir

La peste porcine africaine a été décrite pour la première fois au Kenya en 1921, puis elle a été signalée ultérieurement dans plusieurs pays africains. De nombreuses incursions de la peste porcine africaine sont survenues hors d'Afrique au cours des années 1960 et 1970, éradiquées pour la plupart [1]. Dans les années 1990 et 2000, la maladie a persisté sur le continent africain et sur l'île italienne de Sardaigne. En 2007, elle est survenue à nouveau, hors d'Afrique, dans la région du Caucase, touchant la Géorgie, l'Arménie et la Russie en 2007, l'Azerbaïdjan en 2008, puis atteignant l'Union Européenne en 2014. En 2018, la peste porcine africaine s'est propagée à la République Populaire de Chine, puis, ultérieurement, à d'autres pays d'Asie et d'Europe où elle n'avait jamais été signalée auparavant.

La distribution récente de la maladie à l'échelle mondiale au cours de la période de 2016 à 2020 (à la date du 18 juin) est représentée sur la figure 1.

Depuis 2005, la peste porcine africaine s'est répandue à travers 66 pays sur trois continents (Afrique, Asie et Europe). Plus précisément, à la date de juin 2020, 32 pays d'Afrique[1], 20 pays d'Europe[2] et 14 pays d'Asie[3] avaient notifié cette maladie à l'OIE.



Fig. 1. Distribution mondiale de la peste porcine africaine entre 2016 et 2020 (à la date du 18 juin)

Dans ce contexte, le Système mondial d'information zoosanitaire (WAHIS) joue un rôle essentiel pour centraliser, vérifier et publier en temps utile les informations concernant la survenue de foyers de peste porcine africaine fournies par les Autorités vétérinaires nationales. En 2020[4], 27 % de toutes les notifications immédiates soumises à l'OIE concernaient la peste porcine africaine.

C'est grâce au système WAHIS que l'OIE informe la communauté internationale de l'évolution de la situation au regard de la maladie, au moyen de messages d'alerte, de rapports de suivi hebdomadaires, de bulletins épidémiologiques régionaux hebdomadaires pour l'Asie et de bulletins épidémiologiques mondiaux bimensuels. En outre, afin de garantir la transparence en matière de notification de la maladie, l'OIE a mis en place une recherche active d'informations non officielles, améliorant ainsi l'objectivité et la rapidité de la notification par les pays.

---

(1) Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Cameroun, Centrafricaine (Rép.), Congo (Rép. Dém. du), Congo (Rép. du), Côte d'Ivoire, Éthiopie, Gambie, Ghana, Guinée-Bissau, Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maurice, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Sénégal, Sierra Leone, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie, Zimbabwe. Source : WAHIS, 2020.
(2) Arménie, Azerbaïdjan, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Estonie, Géorgie, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Lituanie, Moldavie, Pologne, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, République Tchèque, Ukraine. Source : WAHIS, 2020.
(3) Cambodge, Chine (Rép. Pop. de), Corée (Rép. Dém. et Pop. de), Corée (Rép. de), Hong Kong (Région administrative spéciale de la Rép. Pop. de Chine), Inde, Indonésie, Laos, Mongolie, Myanmar, Papouasie–Nouvelle Guinée, Philippines, Timor-Leste, Vietnam. Source : WAHIS, 2020.
(4) Au 24 juin 2020.

http://dx.doi.org/10.20506/bull.2020.1.3118

Système mondial d'information sanitaire de l'OIE (WAHIS)
Accès à l'interface de la base de données mondiale d'information sanitaire (*WAHIS Interface*)

PERSPECTIVES

OPINIONS ET STRATÉGIES

La peste porcine africaine et le Système mondial d'information sanitaire de l'OIE

MOTS-CLÉS

#Organisation mondiale de la santé animale (OIE), #OIE-WAHIS, #peste porcine africaine.

AUTEURS

Service d'information et d'analyse de la santé animale mondiale, Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

© FotografiaBasica/Getty Images

RÉFÉRENCES

1. Organisation mondiale de la santé animale (OIE) (2018). – Chapter 3.8.1. African swine fever (infection with African swine fever virus). *In* Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, 8e edition.

L'OIE est une organisation internationale créée en 1924. Ses 182 Membres lui ont donné pour mandat d'améliorer la santé et le bien-être animal. Elle agit avec l'appui permanent de 325 centres d'expertise scientifique et de 12 implantations régionales présents sur tous les continents.

Suivez l'OIE sur www.oie.int

@OIEAnimalHealth

World Organisation for Animal Health - OIE

OIEVideo

World Organisation for Animal Health

World Organisation for Animal Health (OIE)

Version digitale : **www.oiebulletin.com**

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ ANIMALE
Protéger les animaux, préserver notre avenir

12, rue de Prony - 75017 Paris, France
Tél. : +33 (0)1 44 15 18 88 - Fax : +33 (0)1 42 67 09 87 - oie@oie.int